

## B ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

**Θέμα 1.** Υποψήφιος ασφαλιζόμενος με κεφάλαιο  $w$  και ωφελιμοσυνάρτηση  $u(w) = 1 - e^{-w/20}$  αντιμετωπίζει δύο ανεξάρτητους κινδύνους  $X_1, X_2$ , με πυκνότητες

$$f_{X_1}(x) = xe^{-x}, \quad x > 0, \quad f_{X_2}(x) = \frac{1}{24}x^4e^{-x}, \quad x > 0.$$

Σκέπτεται να προβεί σε ολική κάλυψη των ζημιών, αλλά μπορεί να διαλέξει μεταξύ δύο εκδοχών: Να ασφαλιστεί χωριστά για τις ζημιές  $X_1, X_2$  σε δύο εταιρείες, ή να ασφαλιστεί για όλη τη ζημιά  $X = X_1 + X_2$  σε μία εταιρεία. (α) Προσδιορίστε τα μέγιστα αποδεκτά ασφάλιστρα  $G_1, G_2$  για την πρώτη εκδοχή, καθώς και το μέγιστο αποδεκτό ασφάλιστρο  $G$  για τη δεύτερη εκδοχή. (β) Αν η ασφαλιστική εταιρεία έχει ωφελιμοσυνάρτηση  $u_I(w_0) = 1 - e^{-w_0/10}$ , ποιο είναι το ελάχιστο ασφάλιστρο  $H$  που θα απαιτήσει από τον ασφαλιζόμενο για ολική κάλυψη της παραπάνω συνολικής ζημιάς  $X$ ; Υπάρχει ασφαλιστική πολιτική όσον αφορά τη δεύτερη εκδοχή; (γ) Αν  $F_1$  είναι η συνάρτηση κατανομής της  $X_1$ , και  $I_d(X_1) = \max\{0, X_1 - d\}$  η μερική κάλυψη υπερβάλλοντος ζημιάς για την  $X_1$ , να αποδείξετε ότι για τυχόν  $d > 0$ ,

$$\mathbb{E}[I_d(X_1)] = \int_d^\infty (1 - F_1(y))dy.$$

Με βάση την προηγούμενη έκφραση να συμπεράνετε ότι η εξίσωση  $\mathbb{E}[I_d(X_1)] = P$  έχει μοναδική λύση (ως προς  $d$ ) για κάθε (σταθερό)  $P \in (0, 2)$ , και να υπολογίσετε το ποσό αποκοπής  $d$  για το οποίο  $\mathbb{E}[I_d(X_1)] = \frac{11}{5}e^{-1/5}$ .

**Θέμα 2.** Οι ανεξάρτητες και ισόνομες τ.μ.  $X_i = X_i^{(\nu)}$ ,  $i = 1, 2, \dots$  ακολουθούν  $\Gamma(2/\nu, 1)$  κατανομή, δηλ. έχουν πυκνότητα

$$f_{X_i} = \frac{x^{\frac{2}{\nu}-1}}{\Gamma(\frac{2}{\nu})}e^{-x}, \quad x > 0, \quad i = 1, 2, \dots$$

Μια εταιρεία έχει αναλάβει να καλύψει τη συνολική ζημιά  $S_\nu = X_1 + X_2 + \dots + X_{N_\nu}$ , όπου ο αριθμός των ζημιών  $N_\nu$  ακολουθεί κατανομή Poisson με μέσο  $\nu/2$ , και είναι ανεξάρτητος από τα ύψη των ατομικών ζημιών  $X_i$ ,  $i = 1, 2, \dots$ . (α) Υπολογίστε τη μέση τιμή,  $\mathbb{E}[S_\nu]$ , και τη διασπορά,  $\text{Var}[S_\nu]$ , της  $S_\nu$ . (β) Βρείτε τη ροπογεννήτρια  $M_{S_\nu}(t)$  της  $S_\nu$ . (γ) Βρείτε προς ποια κατανομή συγκλίνει η  $S_\nu$  καθώς  $\nu \rightarrow \infty$ , και προσδιορίστε κατά προσέγγιση την  $\mathbb{P}(S_{200} > 1)$ .

**Θέμα 3.** (α) Τα τυχαία επιτόκια  $I_1, \dots, I_n$  για τα επόμενα  $n$  έτη είναι ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές, καθένα με πυκνότητα

$$f(x) = 1500x^2(1 - 5x), \quad 0 < x < 1/5.$$

Να υπολογισθούν (i) η πυκνότητα  $g(y)$  των αντιστοίχων ετησίων εντάσεων ανατοκισμού  $\Delta_j = \log(1 + I_j)$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ , (ii) η μέση τιμή και η διασπορά της μέλλουσας (συσσωρευμένης) αξίας της μονάδας μετά από  $n$  έτη, και (iii) η μέση συσσωρευμένη αξία της προκαταβαλόμενης ράντας  $n$  περιόδων.

(β) Η ένταση θνησιμότητας ενός πληθυσμού είναι (εδώ  $a > 0$ , σταθερά)

$$\mu(x) = \begin{cases} 20ae^{\frac{100-x^2}{100}}, & 0 \leq x \leq 10, \\ 2ax, & x \geq 10. \end{cases}$$

Για τυχόν  $x \geq 0$ , συμβολίζουμε με  $T_x$  την τυχαία μεταβλητή που παριστάνει την υπόλοιπη ζωή ατόμου ηλικίας  $x$ , δηλαδή του  $(x)$ . Υπολογίστε (i) την συνάρτηση κατανομής της  $T_{10}$ , (ii) την πιθανότητα  ${}_t p_{10}$  όπως ο (10) επιβιώσει για τουλάχιστον  $t$  ακόμη έτη, και (iii) την σταθερά  $a$ , αν είναι γνωστό ότι  $\mathbb{E}[(20 + T_{10})T_{10}] = 200$ .

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2½ ΩΡΕΣ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!**